

L'infirmier libéral face à l'urgence

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION

IDEL

Ne nécessite pas de pré-requis

ORGANISATION

Durée : 2 jours (14 heures)

Atelier de formation sur site

SUIVI ET

AMELIORATION DES PRATIQUES (EN PRESENTIEL OU EN NON PRESENTIEL)

- Evaluation de la formation
- Réponse à des questionnaires
- Restitution orale ou écrite des participants, bilan individuel

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Apports théoriques/diaporama
- Cas concrets
- Débats/ discussions

INGENIERIE

PEDAGOGIQUE

Vincent Lautard

Infirmier juriste formateur conseil

Membre du comité scientifique

Cofordis

Objectifs de la formation

- Connaître la responsabilité des infirmiers libéraux ayant participé ou étant confronté à des situations d'urgences vitales
- Savoir reconnaître une situation d'urgence et savoir adapter ses réactions en fonction.
- Savoir effectuer des soins infirmiers de premiers secours



Programme

– réf. : P.SA.INLIFAU

ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

- Cas concret
- Echange et réflexion sur les différentes situations rencontrées par les professionnels de santé

ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES

1. Définition : l'urgence une notion vaste
2. L'infirmier seul face à l'urgence : que disent les textes de lois et les textes réglementaires
3. Les principales pathologies et les principales situations urgentes rencontrées par l'IDEL : comment les reconnaître, comment y faire face

4. Les premiers gestes qui sauvent

- ✓ un bilan efficace, une alerte rapide, une position adaptée
- ✓ Le patient présente des difficultés respiratoires

4. Les premiers gestes qui sauvent (suite)

- ✓ Le patient présente une douleur thoracique
- ✓ Le patient présente une hémorragie sévère
- ✓ Le patient présente une intoxication au fumée (gaz, fumée incendie...)
- ✓ Le patient présente une réaction allergique grave
- ✓ Le patient est inconscient
- ✓ Le patient est en arrêt cardio-respiratoire
- ✓ Le patient présente un traumatisme, une douleur aiguë ou une brûlure
- ✓ Le patient présente un malaise (vagal, hypoglycémique, convulsion...)

5. Le positionnement de l'IDEL suite à l'urgence : le lien avec les familles et le médecin traitant, le lien avec la structure hospitalière, les transmissions